

AVERTISSEMENTS AGRIQUES téléimprimés EDITION GRANDES CULTURES

DLP 13



**STATION
POITOU-CHARENTES**

BIBLN
17711 03013 00097 3130A 10/05/94-16h U
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
REGIE DEPOT LEGAL
PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE
58, RUE RICHELIEU

Bulletin n° 263 (12/94) du 10 Mai 1994

75000 PARIS

BLE	: Des foyers de rouille jaune
ORGE DE PRINTEMPS	: Attention aux pucerons
MAIS	: Le point sur la sésamie

BLE

Stade dernière feuille à épilaison.

ROUILLE JAUNE

Une attaque est signalée dans le secteur de Civray (86). Cette maladie caractérisée par des pustules "en lignes" qui suivent les nervures apparaît par foyers de quelques m² puis explose rapidement. Réctal, Sidéral et Thésée sont très sensibles.

AUTRES MALADIES

Le contenu du précédent bulletin reste valable.

Préconisation

Le traitement préconisé dans le bulletin n° 262 permet de couvrir le risque Rouille jaune dans les secteurs concernés ainsi que la Rouille brune et la Septoriose en tous secteurs.

PUCERONS DES EPIS

Une intervention s'avère nécessaire dans quelques parcelles abritées où le seuil de 1 épi sur 2 colonisé est atteint notamment en Charente Maritime. Surveillez l'évolution des populations jusqu'au stade grain laitex.

ORGE DE PRINTEMPS

PUCERONS

Situation

La présence de pucerons vecteurs de la JNO est confirmée.

Préconisation

Intervenir immédiatement après contrôle de leur présence. Plus d'intervention à la montaison.

MAIS

SESAMIE

Situation

Des sondages effectués à la fin de l'hiver indiquent un taux de mortalité faible (50 % contre 90 % en

1993). La prudence sera de rigueur dans la zone à risque définie dans l'Avertel p 64. La nymphose a débuté début Avril. Le vol devrait commencer maintenant.

Préconisation

Les dates optimales d'intervention seront fournies dans un prochain bulletin.

POIS

Stade bourgeonnement à début floraison.

PUCERONS

Situation

Pas d'évolution des populations.

Préconisation

Ne pas intervenir, les seuils n'étant pas atteints (voir dossier Avertel p 22).

MALADIES

Situation

Peu, voire pas d'anthracnose.

Préconisation

Si le temps devient sec, la 1ère intervention visant le botrytis début floraison pourra éventuellement être décalée jusqu'au retour du temps humide. Selon l'évolution des conditions climatiques et des symptômes, le renouvellement du traitement sera envisagé 15 jours plus tard.

COLZA

Stade G4 (dix premières siliques bosselées).

PUCERONS CENDRES DU CHOU

Situation - Préconisation

On observe moins de colonies que fin Avril ; Ne pas intervenir.

ALTERNARIA

Situation - Préconisation

Maladie absente, ne pas intervenir.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel: 350 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: G. GOARANT
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693